Découvrez nos
nouveaux génériques !

VIATRIS

Präparat Préparation	Galen. Form / Dosierung Forme galén. / dosage		Packung Emballage	FAP (CHF)[1] P-Exf (CHF)	per Einheit par unité	PP (CHF)[1]	Tablettenabbildung[2] Image des comprimés
Rosuvastatin Viatris®	Filmtabletten / comprimés pelliculés	5 mg	30	7.12	0.24	16.35	
			105	23.75	0.23	43.65	
		10 mg	30	8.12	0.27	17.50	
			105	27.08	0.26	47.50	
		20 mg	30	11.78	0.39	25.80	
			105	39.28	0.39	61.50	
Duloxetin Viatris®	Kapseln / capsules	30 mg	28	14.37	0.51	28.80	
		60 mg	14	13.35	0.95	27.65	
			28	25.30	0.90	45.45	
			84	73.86	0.88	101.20	
Escitalopram Viatris®	Filmtabletten / comprimés pelliculés	10 mg	14	5.48	0.39	14.50	
			28	9.74	0.35	19.40	
			98	31.54	0.32	52.60	
		20 mg	98	63.68	0.65	89.50	
Pantoprazol Viatris®	Filmtabletten / comprimés pelliculés	20 mg	15	3.71	0.25	8.35	
			30	6.44	0.21	15.60	
			60	11.99	0.20	26.05	
			120	21.92	0.18	41.55	
		40 mg	7	3.15	0.45	7.70	
			15	5.92	0.39	15.00	
			30	11.06	0.37	25.00	
			60	15.44	0.26	34.15	
			105	27.14	0.26	47.55	
Clozapin Viatris® Auto-GX	Tabletten / comprimés	25 mg	50	8.69	0.17	18.20	
		100 mg	50	22.86	0.18	42.65	
Sunitinib Mylan®	Kapseln / capsules	12.5 mg	28	976.88	34.89	1132.90	
		25 mg	28	1953.62	69.77	2204.15	
		50 mg	28	3716.13	132.72	4055.05	
Ezetimib-Rosuvastatin Mylan®	Filmtabletten / comprimés pelliculés	10 mg/10 mg	30	25.05	0.83	45.15	
			90	75.15	0.83	102.65	
		10 mg/20 mg	30	28.83	0.96	49.50	
			90	86.50	0.96	115.70	
Amlodipin Valsartan Mylan®	Filmtabletten / comprimés pelliculés	5mg/80 mg	28	11.36	0.41	25.35	
		5 mg/80 mg	98	36.71	0.37	58.55	
		5 mg/160 mg	28	13.48	0.48	27.80	
		5 mg/160 mg	98	47.13	0.48	70.50	
		10 mg/160 mg	28	13.48	0.48	27.80	
		10 mg/160 mg	98	47.13	0.48	70.50	

References:
1. Liste des spécialités (LS) par 01.05.2022, www.spezialitätenliste.ch
2. Image pas 1:1

MUL-2022-2111_FR_04052022

Mylan Pharma Gmbh (a Viatris Company) Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen
Pfizer PFE Switzerland GmbH (a Viatris Company) Schärenmoosstrasse 99 8052 Zürich

VIATRIS

Information professionnelle abrégée de Pantoprazol Viatris, comprimés gastro-résistants

C: Pantoprazole sodique sesquihydraté.

I/P: Reflux gastro-œsophagien, traitement des ulcères, œsophagite par reflux, syndrome de Zollinger-Ellison, hypersécrétion pathologique d'acide gastrique, infection à *Helicobacter pylori*.

P/M: Les comprimés gastro-résistants ne doivent être ni croqués ni écrasés, mais avalés entiers avec un peu d'eau 1 heure avant un repas.
Reflux gastro-œsophagien léger: En règle générale, la posologie recommandée est de 1 comprimé gastro-résistant de Pantoprazol Viatris 20 mg par jour. *Traitement au long cours et prévention des récidives de l'œsophagite par reflux:* En règle générale, 1 comprimé gastro-résistant de Pantoprazol Viatris 20 mg par jour; en cas de récidive, la dose journalière peut être portée à 40 mg, puis ramenée à 20 mg de pantoprazole une fois la guérison obtenue. *Éradication d'Helicobacter pylori:* Traitement combiné par deux antibiotiques (selon le profil de résistance et les directives). *Ulcère duodénal, ulcère gastrique, œsophagite par reflux et prévention des ulcères gastro-duodénaux induits par les AINS:* En règle générale, 1 comprimé gastro-résistant de Pantoprazol Viatris 40 mg par jour. *Syndrome de Zollinger-Ellison et affections associées à une hypersécrétion pathologique d'acide gastrique:* Posologie initiale recommandée de 80 mg, à ajuster ensuite individuellement en fonction de la sécrétion d'acide gastrique. À des posologies supérieures à 80 mg par jour, la dose journalière doit être répartie sur deux prises. Une augmentation momentanée de la posologie au-delà de 160 mg de pantoprazole par jour est possible.

CI: Hypersensibilité connue au principe actif, aux benzimidazoles substitués ou à l'un des composants de Pantoprazol Viatris.

M/P: En cas d'insuffisance hépatique sévère, contrôler régulièrement les taux d'enzymes hépatiques pendant le traitement par Pantoprazol Viatris. L'administration de Pantoprazol Viatris 40 mg en prévention des ulcères gastro-duodénaux induits par les AINS doit être limitée aux patients chez lesquels un traitement par AINS est indispensable et qui présentent un risque accru de développer des complications gastroduodénales. Le pantoprazole peut augmenter légèrement le risque d'infection gastro-intestinale d'origine bactérienne. Le traitement quotidien prolongé (pendant plusieurs années) par des médicaments qui bloquant la sécrétion acide peut provoquer une malabsorption de la cyanocobalamine (vitamine B_{12}) par hypochlorhydrie ou achlorhydrie. Des cas d'hypomagnésémie sévère ont été rapportés chez des patients traités avec des inhibiteurs de la pompe à protons pendant au moins 3 mois, mais le plus souvent pendant un an. Les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent, en particulier lorsqu'ils sont utilisés à fortes doses et sur une longue période (>1 an), augmenter légèrement le risque de fractures de la hanche, du poignet et de la colonne vertébrale, surtout chez les personnes âgées ou présentant d'autres facteurs de risque. Le traitement par Pantoprazol Viatris peut masquer les symptômes d'une tumeur maligne éventuelle. Des examens complémentaires doivent donc être envisagés en présence de signaux d'alerte ou en cas de persistance des symptômes.

IA: En raison de l'inhibition profonde et durable de la production d'acide gastrique, le pantoprazole peut diminuer la résorption des médicaments dont la biodisponibilité est pH-dépendante.

EI: Les effets indésirables les plus fréquemment signalés sont la diarrhée et les céphalées. Des polypes glandulaires bénins apparaissent fréquemment sur le fundus.

P: Pantoprazol Viatris 20 mg. Emballages avec 15, 30, 60 et 120 comprimés gastro-résistants. Pantoprazol Viatris 40 mg. Emballages avec 7, 15, 30, 60 et 105 comprimés gastro-résistants. Liste B; admis par les caisses.

Informations détaillées, notamment sur la posologie/le mode d'emploi, les contre-indications, les mises en garde/précautions, les interactions, la grossesse/l'allaitement et effets indésirables, voir information professionnelle sur www.swissmedicinfo.ch.

Titulaire de l'autorisation: Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, tél. 041 768 48 48

Mise à jour de l'information en février 2021

[Version 101 F]

Information professionnelle abrégée de Rosuvastatin Viatris, comprimés pelliculés

C: Rosuvastatine calcique.

I/P: *Adultes:* hypercholestérolémie, prévention des événements cardio-vasculaires chez les adultes présentant un taux normal de LDL-cholestérol et un risque accru de maladies cardio-vasculaires athéroscléreuses.
Enfants et adolescents (10-17 ans): hypercholestérolémie familiale hétérozygote.

P/M: La dose recommandée se situe entre de 5 à 20 mg une fois/jour.

CI: Hypersensibilité avérée à la rosuvastatine ou à l'un des excipients. Patients présentant une affection hépatique évolutive, y compris élévations inexpliquées et prolongées des transaminases sériques et toute augmentation des transaminases sériques au-delà de 3 fois la limite supérieure de la norme (ULN). Patients avec une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine <30 ml/min). Myopathie, traitement simultané par ciclosporine. Pendant la grossesse, l'allaitement et chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de moyens contraceptifs appropriés.
La dose de 40 mg est contre-indiquée chez les patients asiatiques et chez les patients présentant des facteurs prédisposant au développement d'une myopathie/rhabdomyolyse.

M/P: La rosuvastatine peut exercer une influence sur la musculature squelettique et provoquer une myalgie, une myosite ainsi qu'une myopathie pouvant évoluer en rhabdomyolyse. Les statines devraient être prescrites avec prudence aux patients présentant des facteurs prédisposant à l'apparition d'une rhabdomyolyse. Le taux de CPK doit être mesuré si, durant un traitement par des statines, un patient souffre de douleurs musculaires, de faiblesse musculaire ou de crampes musculaires. Rosuvastatin Viatris doit être utilisé avec précaution chez les patients consommant d'importantes quantités d'alcool et/ou présentant des antécédents de maladie hépatique. Des élévations de l'HbA_{1c} et du glucose sérique ont été observées chez des patients sous rosuvastatine. La prudence est de mise lors de la co-administration de fibrates avec Rosuvastatin Viatris.

IA: L'utilisation concomitante de Rosuvastatin Viatris et de médicaments inhibiteurs de protéines de transport peut entraîner une concentration plasmatique accrue de rosuvastatine, et par là un risque accru de myopathie. L'administration concomitante de rosuvastatine avec certains inhibiteurs de protéases peut augmenter l'exposition à la rosuvastatine. L'association de Rosuvastatin Viatris avec l'acide fusidique peut causer des rhabdomyolyses à évolution éventuellement fatale. L'administration simultanée de Rosuvastatin Viatris et de la warfarine peut entraîner une augmentation de l'INR.

EI: Fréquents: diabète, vertiges, céphalées, douleurs abdominales, constipation, nausées, myalgie, asthénie.

P: Rosuvastatin Viatris 5 mg (non sécables), 10 mg, 20 mg, 40 mg (sécables). Emballages de 30 et 105 comprimés pelliculés. Liste B; admis par les caisses.

Informations détaillées, notamment sur la posologie/le mode d'emploi, les contre-indications, les mises en garde/précautions, les interactions, la grossesse/l'allaitement et les effets indésirables, voir information professionnelle sur www.swissmedicinfo.ch.

Titulaire de l'autorisation: Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, tél. 041 768 48 48

Mise à jour de l'information en juin 2020

[Version 101 F]