

Informationen über kadefemin® mycostop¹

Inhalt Kombipack

- 3 Vaginaltabletten mit je 200 mg Clotrimazol
- 20 g Vaginalcreme mit 2% Clotrimazol
- Wiederverwendbarer Kunststoffapplikator

Indikation

- Vulvovaginale Infektionen durch Pilze (meist *Candida*)

Dosierung

- An drei aufeinanderfolgenden Tagen wird 1× täglich abends 1 Vaginaltablette möglichst tief in die Vagina eingeführt
- Zusätzlich wird die Creme 3× täglich auf die erkrankten Hautstellen im Anogenitalbereich dünn aufgetragen

Anwendungshinweise

- Während der Schwangerschaft soll das Arzneimittel nicht angewendet werden, es sei denn, dies ist klar notwendig (ohne Applikator)
- Keine Anwendung während der Menstruation bzw. abgeschlossen vor deren Beginn
- Keine gleichzeitige Anwendung von vaginalen Desodorantien oder vaginalen Mitteln zur Intimhygiene
- Keine gleichzeitige Anwendung mit Latexkondomen (Verminderung der Reissfestigkeit von Kondomen möglich)

Erklärvideo



kadefemin® mycostop in 3 Minuten erklärt.

Bestellungen für Werbematerial oder Fragen zum Produkt nehmen wir gerne via Telefon oder E-Mail entgegen:

- bestellung@zellerag.ch
- 071 466 05 00



¹ kadefemin® mycostop: www.swissmedicinfo.ch (Stand der Information: Dezember 2020).

W: 1 Vaginaltablette enthält 200 mg Clotrimazol, 1 g Creme enthält 20 mg Clotrimazol **I:** Vulvovaginale Infektionen durch Pilze **D:** An 3 aufeinanderfolgenden Tagen: 1× täglich abends 1 Vaginaltablette einführen und 3× täglich Creme auf erkrankte Hautstellen auftragen **KI:** Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff **IA:** Tacrolimus, topische Antimykotika wie Amphotericin B, Nystatin oder Natamycin, Latexprodukte **UW:** Überempfindlichkeitsreaktionen, Abdominalschmerzen, Übelkeit, Diarrhoe, Unterleibsschmerzen, vaginale Blutungen, lokale Reizungen **AK:** D **ZI:** Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **Detaillierte Arzneimittelinformationen:** www.swissmedicinfo.ch (Stand der Information: Dezember 2020) 1022/2316