Ibuprofène & Paracétamol Réunis en 1 comprimé.

Traitement des douleurs légères à modérées.

Un couple solide en cas de douleur: Ibu Sandoz® Plus

CH2306229056 06/2023

Un analgésique destiné à l'automédication – Un atout pour vos clients

Peut être utilisé spécifiquement lorsque l'utilisation seule de l'ibuprofène ou du paracétamol ne permet pas de soulager suffisamment la douleur.[1]

Réunit les avantages de deux principes actifs éprouvés, l'ibuprofène et le paracétamol, dans un comprimé.[1,2]

Produit un effet synergique grâce aux différences de l'ibuprofène et du paracétamol en matière de site et de mécanisme d'action.[1]

Un analgésique destiné à l'automédication – Un atout pour vos clients

Peut être utilisé spécifiquement lorsque l'utilisation seule de l'ibuprofène ou du paracétamol ne permet pas de soulager suffisamment la douleur.[1]

Réunit les avantages de deux principes actifs éprouvés, l'ibuprofène et le paracétamol, dans un comprimé.[1,2]

Produit un effet synergique grâce aux différences de l'ibuprofène et du paracétamol en matière de site et de mécanisme d'action.[1]

1 Information professionnelle Ibu Sandoz® Plus, mise à jour mars 2022. www.swissmedicinfo.ch.

2 Abushanab D, Al-Badriyeh D. Efficacy and Safety of Ibuprofen Plus Paracetamol in a Fixed-Dose Combination for Acute Postoperative Pain in Adults: Meta-Analysis and a Trial Sequential Analysis. CNS Drugs. 2021;35(1):105-120.

Indication thérapeutique et utilisation

Pour une utilisation à court terme en cas de douleurs légères à modérées, par exemple :[1,2]

- **Céphalées et migraine**
- **Dorsalgie**
- **Maux de dents**
- **Douleurs menstruelles**
- **Douleurs rhumatismales et musculaires**
- **Symptômes grippaux**

- **Pour les adultes à partir de 18 ans**
- **1–2 comprimés par prise**
- **Jusqu'à 3x par jour[1]**

Indication thérapeutique et utilisation

Pour une utilisation à court terme en cas de douleurs légères à modérées, par exemple :[1,2]

- **Céphalées et migraine**
- **Dorsalgie**
- **Maux de dents**
- **Douleurs menstruelles**
- **Douleurs rhumatismales et musculaires**
- **Symptômes grippaux**

- **Pour les adultes à partir de 18 ans**
- **1–2 comprimés par prise, jusqu'à 3x par jour[1]**

1 Information professionnelle Ibu Sandoz® Plus, mise à jour mars 2022. www.swissmedicinfo.ch.

2 Données internes.

Une solution pour les besoins exigeants des clients

Ibu Sandoz® Plus aide lorsque l'utilisation seule de l'ibuprofène ou du paracétamol ne permet pas de soulager suffisamment la douleur :[1]

Rapide[2,3]
Agit après seulement 15,6 minutes

Durable[2,3]
Agit jusqu'à 8 heures

Bien toléré[4,5]
Meilleure tolérance grâce à un dosage faible de l'ibuprofène

Une solution pour les besoins exigeants des clients

Ibu Sandoz® Plus aide lorsque l'utilisation seule de l'ibuprofène ou du paracétamol ne permet pas de soulager suffisamment la douleur.[1]

15 min

Rapide[2,3]
Agit après seulement 15 6 minutes

8h

Durable[2,3]
Agit jusqu'à 8 heures

Bien tolérée[2,3,4,5]
Meilleure tolérance grâce à un dosage individuel

1 Information professionnelle Ibu Sandoz® Plus, mise à jour mars 2022. www.swissmedicinfo.ch.

2 Données internes.

3 Mehlisch DR, et al. A single-tablet fixed-dose combination of racemic ibuprofen/paracetamol in the management of moderate to severe postoperative dental pain in adult and adolescent patients: a multicenter, two-stage, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, factorial study. Clin Ther. 2010;32(6):1033-49.

4 Moore RA, et al. Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(11):CD010794.

5 Abushanab D, Al-Badriyeh D. Efficacy and Safety ofIbuprofen Plus Paracetamol in a Fixed-Dose Combinationfor Acute Postoperative Pain in Adults: Meta-Analysis and aTrial Sequential Analysis. CNS Drugs. 2021;35(1):105-120.

Taux de succès élevé[1] – Des études prouvent l'efficacité du médicament Ibu Sandoz® Plus

Taux de succès des analgésiques en vente libre en cas de douleur aiguë[1]

(taux de succès potentiel maximal de 100 % moins le taux de réponse au placebo (en %))



Taux de succès élevé[1] – Des études prouvent l'efficacité du médicament Ibu Sandoz® Plus

Taux de succès des analgésiques en vente libre en cas de douleur aiguë[1]

(taux de succès potentiel maximal de 100 % moins le taux de réponse au placebo (en %))



* En cas de 2 comprimés par prise.

** En cas de 1 comprimé par prise.

1 Moore RA, et al. Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(11):CD010794.

Disponible dès maintenant : Ibu Sandoz® Plus

- Dans un blister unidose pratique
- Sans lactose et sans gluten[1]
- Durée de conservation de 36 mois[2]

Comprimé pelliculé Ibu Sandoz® Plus :

200 mg/500 mg

L'illustration de l'emballage et du comprimé pelliculé ne correspond pas à la taille originale.

Produit	PEF (en CHF)	Pharmacode	Code EAN
Ibu Sandoz® Plus **200 mg Ibuprofène/500 mg Paracétamol** 20 comprimés pelliculés	8.85	1021188	7 680686 700024 swissmedic

Disponible dès maintenant : Ibu Sandoz® Plus

- **Dans un blister unidose pratique**
- **Sans lactose et sans gluten[1]**
- **Durée de conservation de 36 mois[2]**

Comprimé pelliculé Ibu Sandoz® Plus :

200 mg/500 mg

L'illustration de l'emballage et du comprimé pelliculé ne correspond pas à la taille originale.

Produit	PEF (en CHF)	Pharmacode	Code EAN
Ibu Sandoz® Plus **200 mg Ibuprofène/500 mg Paracétamol** 20 comprimés pelliculés	8.85		

1 Information professionnelle Ibu Sandoz® Plus, mise à jour mars 2022. www.swissmedicinfo.ch.

2 Données internes.

Douleurs

Formulaire de commande

Ibu Sandoz® Plus

Ibu Sandoz® Plus

Pharmacode	Produit	PEF	EAN	Unité
1021188	Ibu Sandoz® Plus 200 mg Ibuprofène/500 mg Paracétamol 20 comprimés pelliculés	8.85	7 680686 700024	

PEF = Prix Ex Factory (CHF). Liste D, mise à jour des informations : 06/2023.
Pour des informations détaillées, voir le site www.swissmedicinfo.ch

Nom du grossiste :

Numéro de client du grossiste :

Conditions de commande et de livraison
selon votre grossiste

Vous trouverez des informations détaillées sur les produits sur le site
www.medikamenteshop.ch

Merci de votre commande.

Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Téléfax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
www.mysandoz.ch

Cachet/Adresse professionnelle :

Date :

Signature :

Pour toute **question médicale**, n'hésitez pas à nous contacter au **041 763 74 11** ou à l'adresse **medwiss.switzerland@sandoz.com**.
Les demandes sont traitées du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures.

SANDOZ A Novartis Division

QUALITÉ SUISSE AUTHENTIQUE. DEPUIS 1886.

CH23062291010 06/2023

Douleurs

Formulaire de commande

Matériel PdV Ibu Sandoz® Plus

Matériel de PdV

Panneau d'affichage extérieur avec affiche A1	
1 x Ibu Sandoz® Plus Affiche 50102229	☐
Emballages géants et emballages vides	
5 x Emballages vides Ibu Sandoz® Plus 50100365	☐
2 x Emballages géants Ibu Sandoz® Plus 50100362	☐

Veuillez envoyer le formulaire de commande pour le matériel de PdV directement à :

serivce.sandoz@sandoz.com ou par fax au numéro gratuit 0800 858 888

Vous trouverez des informations détaillées sur les produits sur le site
www.medikamenteshop.ch

Merci de votre commande.

Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Téléfax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
www.mysandoz.ch

SANDOZ A Novartis Division

QUALITÉ SUISSE AUTHENTIQUE. DEPUIS 1886.

Cachet/Adresse professionnelle :

Date :

Signature :

Pour toute **question médicale**, n'hésitez pas à nous contacter au **041 763 74 11** ou à l'adresse **medwiss.switzerland@sandoz.com**.
Les demandes sont traitées du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures.

CH230/02230 10 06/2023

Information professionnelle abrégée

Ibu Sandoz® Plus Comprimés pelliculés.
PA: Ibuprofenum, Paracetamolum. **I:** Pour le traitement symptomatique à court terme des douleurs légères à modérées. Ibu Sandoz Plus est utilisé chez les adultes à partir de 18 ans. **PO:** Uniquement pour une utilisation à court terme. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, ou si le médicament est nécessaire pendant plus de 3 jours, le patient doit consulter un médecin. Ibu Sandoz Plus doit de préférence n'être utilisé que lorsque l'utilisation d'ibuprofène ou de paracétamol seuls n'a pas permis un soulagement suffisant de la douleur. Les comprimés doivent être avalés entiers et ne doivent pas être mâchés, cassés, écrasés ou sucés; il est recommandé que les patients prennent Ibu Sandoz Plus avec un repas. *Adultes:* La posologie recommandée est de 1 comprimé pelliculé jusqu''à 3 fois par jour. Un intervalle d'au moins 6 heures doit être respecté entre chaque dose. Instructions de dosage spécifiques (patients âgés, un trouble de la fonction hépatique, un trouble de la fonction rénale) voir l'information professionnelle. **CI:** Hypersensibilité aux principes actifs et aux substances apparentées (p. ex. propacétamol) ou à l'un des autres composants. Alcoolisme actif. Antécédents de réactions d'hypersensibilité (p. ex. bronchospasme, angiooedème, asthme, rhinite ou urticaire) en lien avec l'acide acétylsalicylique ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Antécédents d'hémorragie ou de perforation gastro-intestinale en rapport avec un traitement antérieur par AINS. Hémorragie cérébrovasculaire ou autre hémorragie active ainsi que tendance accrue aux hémorragies et troubles de l'hématopoïèse. Troubles graves de la fonction hépatique, insuffisance rénale sévère (DFGe < 30), insuffisance cardiaque sévère (classe NYHA III-IV). Déshydratation sévère. Troisième trimestre de la grossesse. Enfants et adolescents de moins de 18 ans. Prise concomitante d'autres médicaments contenant des AINS ou du paracétamol. Hyperbilirubinémie constitutionnelle héréditaire. Traitement des douleurs postopératoires après une opération de pontage coronarien. **MP:** *Mise en garde générale concernant l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens systémiques:* Des ulcérations, des hémorragies ou des perforations gastro-intestinales peuvent survenir à tout moment au cours d'un traitement par AINS, sélectifs ou non de la COX-2, même en l'absence de symptômes annonciateurs ou d'antécédents connus. Dans l'attente de données pertinentes, l'ibuprofène ne doit être utilisé qu'après une évaluation minutieuse du rapport bénéfice-risque en cas de maladie coronarienne cliniquement confirmée, de maladie cérébrovasculaire, d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs ou chez les patients présentant des facteurs de risques importants (p. ex. hypertension, hyperlipidémie, diabète sucré, tabagisme). De même, en raison de ce risque, il convient d'administrer la dose efficace la plus faible pendant la durée de traitement la plus courte possible. Les effets rénaux des AINS comprennent la rétention liquidienne avec oedème et/ou hypertension artérielle. Prudence chez les patients dont la fonction cardiaque est altérée et chez ceux qui présentent d''autres affections prédisposant à la rétention liquidienne. La prudence est également de mise chez les patients qui prennent simultanément des diurétiques ou des inhibiteurs de l'ECA, ainsi qu'en cas de risque accru d'hypovolémie. Attention aux consommation simultanée d'alcool. *En plus pour l'ibuprofène:* prudence en cas de maladies des voies respiratoires, troubles de la fonction cardiaque, rénale ou hépatique, évitez d"utiliser l"ibuprofène en association avec des AINS. Prudence chez les patients âgés, troubles de la coagulation. Hémorragies gastro-intestinales, ulcères, perforations. Effets ophtalmologiques. Réactions cutanées. Effets rénaux. Effets hématologiques. Méningite aseptique. Pour les autres MP, voir l"information professionnelle. **IA:** Sauf avis médical, ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que des médicaments contenant du paracétamol, de l'ibuprofène, de l'acide acétylsalicylique et du salicylate, ou que d'autres médicaments anti-inflammatoires (AINS). Influence sur les paramètres biologiques. Ce médicament doit être utilisé avec prudence en association avec les médicaments suivants: enzymatiques tels que le phénobarbital, la phénytoïne, la carbamazépine, l'hydrazide de l'acide isonicotinique (isoniazide, INH) et la rifampicine augmentent l'hépatotoxicité du paracétamol. Alcool. Les médicaments qui ralentissent la vidange gastrique (p. ex. la propanthéline) ou qui accélèrent la vidange de l'estomac (p. ex. le métoclopramide). Chloramphénicol. Chlorzoxazone. Zidovudine. Salicylamide. Probénécide. Cholestyramine. L'effet anticoagulant de la warfarine et d'autres coumarines peut être renforcé, risque d'hémorragie. Hépatotoxicité sévère. Pour les autres IA, voir l"information professionnelle. **SS/SZ:** Pendant le premier et le deuxième trimestres de la grossesse, Ibu Sandoz Plus ne doit être administré qu'en cas de nécessité absolue. La dose doit être aussi faible que possible et la durée du traitement aussi courte que possible. Ibu Sandoz Plus est contre-indiqué pendant le troisième trimestre de la grossesse. L'utilisation d'Ibu Sandoz Plus, comprimés pelliculés n'est pas recommandée pendant le travail et l'accouchement. Le début du travail peut être retardé et sa durée peut être prolongée. L'ibuprofène et le paracétamol passent dans le lait maternel. La concentration de paracétamol dans le lait maternel est similaire à la concentration instantanée dans le plasma de la mère. Des rashs cutanés ont été rapportés chez des nourrissons allaités. Par mesure de précaution, Ibu Sandoz Plus, comprimés pelliculés ne doit donc pas être pris par les femmes qui allaitent. **EI:** *Fréquents: oedème, rétention de liquide. La rétention de liquide répond en général immédiatement à l'arrêt de l'association.* Troubles gastro-intestinaux, tels que douleur abdominale, diarrhée, dyspepsie, nausées, flatulences, constipation, brûlures d''estomac, vomissements et légère perte de sang du tractus gastro-intestinal, pouvant exceptionnellement provoquer une anémie. Augmentation de l'alanine aminotransférase, de la gamma-glutamyltransférase et valeurs anormales de la fonction hépatique sous paracétamol. Augmentation des taux de créatinine et d'urée dans le sang. Pour les autres EI, voir l"information professionnelle. **P:** Boîtes de 10 et 20 comprimés pelliculés (D) **Mise à jour de l'information:** Mars 2022 (KFI V01). **Liste Swissmedic: D.** Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch.

QUALITÉ
SUISSE AUTHENTIQUE.
DEPUIS 1886.

CH2306229056 06/2023

Formulaire de commande

Ibu Sandoz® Plus

Douleurs

Ibu Sandoz® Plus

Pharmacode	Produit	PEF	EAN	Unité
1021188	Ibu Sandoz® Plus 200 mg Ibuprofène/500 mg Paracétamol 20 comprimés pelliculés	8.85	7 680686 700024	☐☐☐

PEF = Prix Ex Factory (CHF). Liste D, mise à jour des informations : 06/2023.
Pour des informations détaillées, voir le site www.swissmedicinfo.ch

Nom du grossiste :

Numéro de client du grossiste :

Conditions de commande et de livraison
selon votre grossiste

Vous trouverez des informations détaillées sur les produits sur le site
www.medikamenteshop.ch

Merci de votre commande.

Cachet/Adresse professionnelle :

Date :

Signature :

Pour toute **question médicale**, n'hésitez pas à nous contacter au **041 763 74 11** ou à l'adresse **medwiss.switzerland@sandoz.com**.
Les demandes sont traitées du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures.

CH2306229010 06/2023

Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Téléfax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
www.mysandoz.ch

SANDOZ A Novartis Division

QUALITÉ SUISSE AUTHENTIQUE. DEPUIS 1886.

Douleurs

Formulaire de commande

Matériel PdV Ibu Sandoz® Plus

Matériel de PdV

Panneau d'affichage extérieur avec affiche A1	
1 x Ibu Sandoz® Plus Affiche 50102229	☐
Emballages géants et emballages vides	
5 x Emballages vides Ibu Sandoz® Plus 50100365	☐
2 x Emballages géants Ibu Sandoz® Plus 50100362	☐

Veuillez envoyer le formulaire de commande pour le matériel de PdV directement à :

serivce.sandoz@sandoz.com ou par fax au numéro gratuit 0800 858 888

Vous trouverez des informations détaillées sur les produits sur le site
www.medikamenteshop.ch

Cachet/Adresse professionnelle :

Date :

Signature :

Pour toute **question médicale**, n'hésitez pas à nous contacter au **041 763 74 11** ou à l'adresse **medwiss.switzerland@sandoz.com**.
Les demandes sont traitées du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures.

CH2306229010 06/2023

Merci de votre commande.

Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14
Case postale
6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885
Téléfax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
www.mysandoz.ch

SANDOZ A Novartis Division

QUALITÉ SUISSE AUTHENTIQUE. DEPUIS 1886.