

Dabigatran Sandoz®

Ce que vous offre Dabigatran Sandoz®

- Seulement 10 % de quote-part [1]
- Plaquette alvéolaire à dose unitaire pratique
- Sans gluten [2]
- Sans lactose [2]
- Durée de conservation de 36 mois [3]

Gélules de Dabigatran Sandoz®:

110 mg



150 mg



L'illustration du capsule ne correspond pas à la taille réelle.

1 Liste des spécialités mise à jour en 11.2023.
2 Information professionnelle Dabigatran Sandoz®, mise à jour en avril 2022, www.swissmedicinfo.ch.
3 Données sur fichier.

Courbe de bioéquivalence de Dabigatran Sandoz®:



3 Données sur fichier.

Dabigatran Sandoz®
est disponible dans les dosages suivants :

ADMIS PAR LES CAISSES-MALADIE[1]

1 Liste des spécialités mise à jour en 11.2023.

Dabigatran Sandoz® est disponible dans les dosages suivants :

Produit	PSU	PP	Pharmacode	Code EAN
Dabigatran Sandoz® **110 mg** 60 gélules	55.78	80.45	1032197	7 680686 580015
Dabigatran Sandoz® **110 mg** 180 gélules	167.34	208.50	1032199	7 680686 580022
Dabigatran Sandoz® **150 mg** 60 gélules	55.78	80.45	1032200	7 680686 580039
Dabigatran Sandoz® **150 mg** 180 gélules	167.34	208.50	1032202	7 680686 580046

PSU = Prix sortie usine (CHF), PP = Prix public (CHF). Admission par les caisses-maladie: Tous les produits figurent sur la liste des spécialités (liste B) (www.listedesspecialites.ch, telle que publiée en novembre 2023). Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch

Information professionnelle abrégée

Dabigatran Sandoz®. Gélules. **PA:** Dabigatran étexilate (sous forme de mésilate de dabigatran étexilate). **I:** Prévention des accidents vasculaires cérébraux et des embolies systémiques chez les patient.e.s adultes atteint.e.s de fibrillation auriculaire non valvulaire. Traitement des patient.e.s adultes atteint.e.s de thrombose veineuse profonde et/ou d'embolie pulmonaire après traitement préalable par héparine fractionnée ou non fractionnée pendant 5 jours et prévention de la thrombose veineuse profonde et/ou de l'embolie pulmonaire récidivante. **PO:** Initiation du traitement par un.e médecin expérimenté.e dans la coagulation sanguine. Prise avec un verre d'eau indépendamment des repas. Recommandé en cas de symptômes gastro-intestinaux lors d'un repas et/ou de l'utilisation d'un inhibiteur de la pompe à protons (sauf contre-indication). Ne pas ouvrir les gélules. La posologie recommandée est Dabigatran Sandoz 150 mg deux fois par jour. Pour des recommandations détaillées par indication, voir l'information professionnelle. **CI:** Hypersensibilité connue au dabigatran ou au dabigatran étexilate ou à l'un des excipients de la préparation; insuffisance rénale sévère ($Cl_{créa}$ < 30 ml/min); co-médication avec des inhibiteurs de la P-gp tels que la quinidine, la dronédarone, le ritonavir, le tipranavir, le nelfinavir, le saquinavir, la ciclosporine et le tacrolimus ainsi que le traitement systémique par le kétoconazole ou l'itraconazole. Manifestation d'hémorragies, patient.e.s présentant une diathèse hémorragique ou dont l'hémostase est compromise spontanément ou par des médicaments; lésions organiques présentant un risque d'hémorragies cliniquement significatives, y compris un accident vasculaire cérébral hémorragique au cours des 6 derniers mois; altération de la fonction hépatique ou maladie hépatique susceptible d'avoir des conséquences sur la survie (insuffisance hépatique CHILD PUGH A, B, C); remplacement artificiel des valves cardiaques. **MP:** Risque hémorragique; fonction rénale altérée; fonction hépatique altérée; utilisation de fibrinolytiques pour le traitement de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu; utilisation concomitante avec le glécaprévir/pibrentasvir; co-médication avec l'amiodarone ou le vérapamil; patient.e.s atteint.e.s du syndrome des antiphospholipides; opérations et interventions; phase préopératoire; rachianesthésie/anesthésie péridurale/ponction lombaire; phase post-intervention; infarctus du myocarde; embolectomie et traitement par thrombolyse. **IA:** L'association avec des traitements qui influencent l'hémostase ou la coagulation sanguine, y compris les antagonistes de la vitamine K, peut considérablement augmenter le risque d'hémorragie. Le ticagrélor augmente l'exposition au dabigatran. Inhibiteurs de la P-gp (la co-médication avec la quinidine, la dronédarone, le ritonavir, le tipranavir, le nelfinavir, le saquinavir, la ciclosporine, le tacrolimus ainsi que le traitement systémique par le kétoconazole ou l'itraconazole sont contre-indiqués). Amiodarone ou vérapamil. Acide acétylsalicylique (AAS), clopidogrel. Le traitement concomitant par héparine LMW n'est pas recommandé. Autres: voir l'information professionnelle. **G/A:** Des études sur l'animal ont montré une toxicité sur la reproduction. Les femmes en âge de procréer doivent éviter de tomber enceintes pendant le traitement par Dabigatran Sandoz. Dabigatran Sandoz ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, à moins que cela ne soit clairement nécessaire. Il est recommandé de ne pas allaiter pendant l'utilisation de Dabigatran Sandoz. **EI:** *Fréquents:* anémie, épistaxis, hémorragie gastro-intestinale, douleurs abdominales, diarrhée, dyspepsie, nausées, hémorragie urogénitale. Autres: voir information professionnelle. **P:** Gélules de Dabigatran Sandoz 110 mg: 60 et 180. Gélules de Dabigatran Sandoz 150 mg: 60 et 180. **Mise à jour de l'information:** décembre 2019 (KFI V01).

Liste B Swissmedic. Pour des informations détaillées, veuillez consulter www.swissmedicinfo.ch.

Sandoz Pharmaceuticals SA, Suurstoffi 14, Case postale, 6343 Rotkreuz, Tél. 0800 858 885, Fax 0800 858 888, service.sandoz@sandoz.com, www.sandoz-pharmaceuticals.ch, www.mysandoz.ch

CH2310276374 11/2023

Formulaire de commande

Dabigatran Sandoz®

Système cardiovasculaire

- **Seulement 10 % de quote-part[1]**
- **Sans lactose[2]**
- **Plaquette alvéolaire à dose unitaire pratique**
- **Durée de conservation de 36 mois[3]**
- **Sans gluten[2]**

Dabigatran Sandoz®

Pharmacode	Posologie	Liste	PSU	PP	Unité	EAN Code
1032197	Dabigatran Sandoz **110 mg,** 60 gélules	B	55.78	80.45		7 680686 580015
1032199	Dabigatran Sandoz **110 mg,** 180 gélules	B	167.34	208.50		7 680686 580022
1032200	Dabigatran Sandoz **150 mg,** 60 gélules	B	55.78	80.45		7 680686 580039
1032202	Dabigatran Sandoz **150 mg,** 180 gélules	B	167.34	208.50		7 680686 580046

PSU = Prix sortie usine (CHF), PP = Prix public (CHF). Admission par les caisses-maladie: Tous les produits figurent sur la liste des spécialités (liste B) (www.listedesspecialites.ch, telle que publiée en novembre 2023). Pour des informations détaillées, voir www.swissmedicinfo.ch

1 Liste des spécialités mise à jour en 11.2023. **2** Information professionnelle Dabigatran Sandoz®, mise à jour en avril 2022, www.swissmedicinfo.ch. **3** Données sur fichier.

Livraison par le grossiste:

Les produits peuvent être commandés régulièrement via votre système de caisse.

Conditions de commande et de livraison
selon vos grossistes

Vous trouverez des informations détaillées sur les produits sous www.medikamenteshop.ch

Cachet / Adresse professionnelle

Date:

Signature:

CH2310276374 11/2023

Merci pour votre commande.

Pour toute **question médicale,** n'hésitez pas à nous contacter au **041 763 74 11** ou sous **medwiss.switzerland@sandoz.com.** Les demandes sont traitées du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

SANDOZ

Sandoz Pharmaceuticals SA
Suurstoffi 14, Case postale, 6343 Rotkreuz
Tél. 0800 858 885, Fax 0800 858 888
service.sandoz@sandoz.com
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
www.mysandoz.ch